



SUMATRIPTAN

ชื่อสามัญ : SUMATRIPTAN

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้ใช้เพื่อช่วยรักษาอาการของโรคไมเกรนหรือโรคปวดหัวข้างเดียว (migraine) ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีสัญญาณบอกเหตุ (aura)
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยานี้เมื่อมีอาการปวดเพียงหนึ่งหรือสองครั้ง หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยานี้เมื่อเริ่มมีอาการหรือสัญญาณบอกเหตุของโรคไมเกรน
- โดยทั่วไปการรับประทานยาเม็ดขนาด 100 มิลลิกรัมเพียงครั้งเดียวจะสามารถบรรเทาอาการได้ แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นหรือกลับมามีอาการอีก ควรบอกแพทย์หรือเภสัชกร และสามารถรับประทานยาอีกครั้งได้โดยเว้นระยะห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- หากผู้ป่วยมีประวัติเคยเป็นโรคหัวใจและไม่เคยใช้ยานี้มาก่อน ควรรับประทานยานี้ในสถานที่ที่แพทย์สามารถดูแลได้อย่างทันท่วงที
- ห้ามรับประทานยานี้มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อครั้ง
- ห้ามรับประทานยานี้มากกว่า 200 มิลลิกรัมภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
- ห้ามรับประทานยานี้มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือบ่อยกว่าที่แพทย์สั่งให้ใช้
- ดื่มน้ำตามมากๆ หลังจากรับประทานยานี้
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร
- การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการใช้นี้อาจทำให้มีอาการมึนงงหรือง่วงซึ่มมากขึ้น
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ดังนั้นจึงไม่ควรลุกขึ้นยืนหรือนั่งลงอย่างรวดเร็ว

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติการแพ้ยา sumatriptan หรือยาอื่นๆ
- ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
- การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
- เป็นผู้ป่วยเพศชายอายุมากกว่า 40 ปี หรือเป็นผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนหรือผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกไปแล้วหรือไม่
- ประวัติการสูบบุหรี่
- การมีหรือเคยมีความผิดปกติของการทำงานของหัวใจ ตับหรือไต
- การเป็นหรือเคยมีประวัติของโรคหลอดเลือดและหัวใจ อาการเจ็บหน้าอก อาการหัวใจล้ม (heart attack) โรคหลอดเลือดสมองตีบ (stroke) โรค coronary artery disease อาการสมองขาดเลือดชั่วคราว (transient ischemic attacks, TIA or mini-strokes) อาการเลือดออกในกะโหลกศีรษะ (intracranial bleeding) ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นผิดจังหวะ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคเบาหวาน (diabetes) โรคลำไส้หรือลำไส้อักเสบ (bowel disease or colitis) โรคลำไส้ขาดเลือด (ischemic bowel disease) โรค Raynauds disease ภาวะอ้วน (overweight) ภาวะการชัก (seizures) อาการเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต
- ประวัติการเป็นโรคหัวใจของคนในครอบครัว

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปยานี้ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้น การลืมรับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย และไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาในมื้อต่อไป

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ เวียนศีรษะ มึนงง ง่วงซึม ใบหน้าและคอแดงหรือร้อนผ่าว ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเป็นตะคริวหรือหดเกร็ง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดหรือไม่สบายท้อง

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ มีอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน ผื่นลมพิษ บวมตามอวัยวะต่างๆ เช่น ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น เปลือกตา หายใจลำบากหรือมีเสียงหวีด มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ
การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป เจ็บคอหรือหน้าอก แน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติจังหวะ หรือหัวใจเต้นเร็วหรือช้าอย่างผิดปกติ มีอาการประสาทหลอน
ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือต่ำลง มีอาการเกี่ยวกับการทรงตัว การพูด การเดิน ชัก ปวดท้องอย่างรุนแรงและหดเกร็งหรือเป็นตะคริว อุจจาระมีเลือดปน มีอาการชา
ไร้ความรู้สึก หรือปวดที่ใบหน้าหรือปลายมือปลายเท้า

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาาระบบยา