



MEBEVERINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ : MEBEVERINE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา : แคปซูล

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง
- ยานี้ใช้เพื่อรักษากลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน (Irritable bowel syndrome: IBS)

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานก่อนอาหารประมาณ 20 นาที โดยให้ใช้น้ำตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลาก ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่ควรเคี้ยวเม็ดยา

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- การแพ้ยาบีเวอรีน (mebeverine) หรือยาอื่นๆ
- ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพรที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
- มีหรือเคยมีภาวะลำไส้ไม่เคลื่อนไหว
- มีหรือเคยมีโรค Porphyria (โรคเลือดชนิดหนึ่ง)
- หากต้องทำการผ่าตัดหรือทำการรักษาทางทันตกรรม ควรแจ้งแพทย์เพื่อหยุดยานี้ก่อนทำการรักษา
- การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ ผิวหนังมีผื่นคัน ผื่นแดง หรืออักเสบ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น บวม

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น เก็บในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น

- ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
-

มีปัญหาเรื่องยา ปรีกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา