



## CEFUROXIME

ชื่อสามัญ : CEFUROXIME

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น หลอดลมอักเสบ โรคหนองใน โรค Lyme โรคติดเชื้อที่หู ล้าคอ ไชนัส ผิวหนังและระบบทางเดินปัสสาวะ
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้ เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลา 7-10 วัน รับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ควรรับประทานเวลาเดียวกันทุกวัน
- การใช้เพื่อรักษาโรคหนองใน ให้รับประทานยานี้ครั้งเดียว หากใช้เพื่อรักษาโรค Lyme รับประทานวันละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วัน
- รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยาดังต่อไปนี้จนครบระยะเวลาในการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- กลืนทั้งเม็ด และดื่มน้ำตามมาก ๆ ยานี้มีรสขมจัดจึงไม่ควรหักแบ่งหรือเคี้ยวเม็ดยา หากเด็กไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ ควรเปลี่ยนไปใช้น้ำแขวนตะกอนแทน

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- แพ้ยา cefuroxime, ยากลุ่ม penicillin, ยากลุ่ม cephalosporin, หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
- มีหรือเคยมีโรคตับ โรคไต โรคกล้ามเนื้อหัวใจ หรือโรคของกระเพาะอาหาร ปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือด
- ตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  
มีดังนี้ ไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- อาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ ตาบวม หนาวบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจหรือกลืนลำบาก
- หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเจ็บหน้าอก ชัก มีไข้ ปัสสาวะมีสีเข้ม ผิวหนังเป็นผื่นแดงหรือมีตุ่มน้ำ เลือดออกหรือมีรอยจ้ำเลือดผิดปกติ อ่อนเพลียผิดปกติ เจ็บหรือมีแผลในปาก ตกขาว คันบริเวณช่องคลอด

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
  - เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
  - ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
- 

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษากร ด้วยความปรารถนาดีจาก  
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา