



## INDOMETACIN [SODIUM]

ชื่อสามัญ : INDOMETACIN [SODIUM]

รูปแบบยา : แคปซูล

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้ใช้บรรเทาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง อาการบวม ข้ออักเสบที่มีสาเหตุมาจากโรคไขข้อกระดูกอักเสบ (osteoarthritis) ไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) และ ไขข้อกระดูกสันหลังอักเสบ (ankylosing spondylitis) ?ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ที่เกิดจากการอักเสบของถุงน้ำบริเวณข้อต่อ (bursitis) หรือเอ็นอักเสบ (tendinitis) อาการเจ็บปวดบวมเฉียบพลันจากโรคเกาต์ ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ได้ เช่น บรรเทาปวด ลดไข้ และแก้ข้ออักเสบ หรือใช้ในกรณีที่ต้องการลดปริมาณแคลเซียมในกระแสเลือด หรือรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ ได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูล โดยทั่วไปให้รับประทานวันละ 2-4 ครั้ง ควรรับประทานยานี้ให้ตรงเวลาเดิมทุกวัน หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ควรรับประทานยาหลังอาหารทันทีพร้อมดื่มน้ำตามหนึ่งแก้ว หรือรับประทานพร้อมกับยาลดกรดเพื่อลดอาการไม่สบายท้องที่อาจเกิดจากยา

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) แอสไพริน (aspirin) หรือยาอื่นๆในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ibuprofen naproxen หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นๆที่อยู่ในตำรับยานี้
- ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะยาต่อไปนี้ ?ยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ตัวอื่นๆ ?ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือใช้สารกันเลือดเป็นลิ่ม? เช่น วาฟาริน (warfarin) แอสไพริน (aspirin) ยากลุ่มสเตียรอยด์ เช่น แพร็ดนิโซโลน (prednisolone)
- มีประวัติเป็นโรคหัวใจ มีอาการหัวใจวาย ?หรือจะเข้ารับผ่าตัดทำศัลยกรรมปลูกถ่ายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (coronary bypass graft surgery) เป็นโรคหลอดเลือดตีบหรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคดังกล่าว
- มีผลในทางเดินอาหาร เช่น ภาวะอาหารลำไส้ หรือมีภาวะเลือดออกผิดปกติ มีหรือเคยมีโรคภาวะหอบหืด โดยเฉพาะหอบหืดที่เกิดจากยาแอสไพริน (aspirin) โดยเฉพาะถ้ามีอาการกำเริบบ่อยๆ มีภาวะตั้งเนื้ออกที่โพรงจมูก (nasal polyps)
- มีโรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น ?โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน (Parkinsons disease) มีภาวะซึมเศร้าหรือมีอาการทางจิต เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไชมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน
- อายุมากกว่า 65 ปี หรือมีความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต เคยมีประวัติการบวมที่มีมือ แขน น่อง เท้า หรือข้อเท้า
- ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 (ช่วง 2-3 เดือนก่อนคลอด) หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- หากต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำฟัน ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ผ่าตัดหรือทันตแพทย์ทราบก่อนว่าท่านใช้ยาตัวนี้อยู่
- สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสเกิดผลหรือเลือดออกในทางเดินอาหารมากขึ้น

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  
มีดังนี้ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ อาเจียน ท้องเสีย หรือท้องผูก ระคายเคืองบริเวณทวารหนัก รู้สึกไม่สบายท้อง มีเสียงดังในหู มีลมในท้อง

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- อาการแสดงถึงความเสี่ยงการเกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดสมอง ควรไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ?เจ็บแน่นหน้าอก ?หายใจขัดหรือหายใจลำบาก ?ร่างกายอ่อนแรงครึ่งซีก ?การพูดติดขัด
- อาการแสดงถึงความเสี่ยงการเกิดความผิดปกติของทางเดินอาหาร ควรหยุดใช้ยาทันทีและแจ้งให้แพทย์ทราบ ?ได้แก่???? ปวดท้องรุนแรง แสบร้อนกลางอก ?อาเจียนเป็นเลือดหรือเป็นสีกาแฟ ?อุจจาระมีเลือดปน มีสีดำ หรือลักษณะคล้ายน้ำมันดิน
- อาการอื่นๆ น้ำหนักเพิ่มโดยไม่มีสาเหตุ มีไข้ ตุ่มพอง ผื่นคัน ลมพิษ บวมบริเวณตา ใบหน้า ลิ้น ริมฝีปาก คอ มือ เท้า ข้อศอก หรือขาส่วนล่าง

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก  
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา