



CEFALEXIN [MONOHYDRATE]

ชื่อสามัญ : CEFALEXIN [MONOHYDRATE]

รูปแบบยา : แคปซูล

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคติดเชื้อที่กระดูก หู ฝีผิวหนัง และระบบทางเดินปัสสาวะ
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยาทุก 6 ชั่วโมง (วันละ 4 ครั้ง) หรือ อาจรับประทานทุก 12 ชั่วโมง (วันละ 2 ครั้ง) ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 7-10 วัน หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยานี้ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาในการรักษาการติดเชื้อ แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- รับประทานยาโดยกลืนยาทั้งเม็ดนี้แล้วดื่มน้ำตามอย่างน้อย 1 แก้ว
- หากรับประทานยาแล้วรู้สึกไม่สบายท้อง ให้รับประทานยานี้พร้อมมื้ออาหารหรือพร้อมนม

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- มีประวัติการแพ้ยา cephalixin, penicillin, ยากลุ่ม cephalosporin หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
- มีหรือเคยมีประวัติโรคไต โรคตับ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคของกระเพาะอาหาร
- กำลังตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- หากต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบก่อนว่าท่านใช้ยาดังนี้อยู่

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ รู้สึกไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาเจียน ผื่นคันไม่รุนแรง

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- ผื่นผิวหนังรุนแรง คัน หรือลมพิษ หายใจหรือกลืนลำบาก หายใจมีเสียงหวีด
- มีเลือดออกหรือมีจ้ำเลือด เจ็บบริเวณปากหรือลำคอ เจ็บหน้าอก ติดเชื้อในช่องคลอด ระบายเคืองบริเวณช่องคลอดหรือทวารหนัก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อ

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษากร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา