



PSEUDOEPHEDRINE [HYDROCHLORIDE] , TRIPROLIDINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ : PSEUDOEPHEDRINE [HYDROCHLORIDE] , TRIPROLIDINE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- รักษาอาการจาม ไอ น้ำมูกไหล คัดจมูก คันตา น้ำตาไหล ผื่นลมพิษ ผื่นคันและอาการอื่นที่เกิดขึ้นจากการแพ้ และรักษาโรคหวัด

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- การใช้ยาในเด็กต่ำกว่า 6 ปี ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์
- หากอาการไม่ดีขึ้นใน 7 วัน หรือมีอาการใช้สูง ให้หยุดใช้ยาและไปพบแพทย์
- ยานี้ อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม ควรระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ
- ห้ามใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม MAO inhibitor เช่น isocarboxazid, phenelzine, selegiline, tranylcypromine โดยต้องมีช่วงห่างกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา pseudoephedrine หรือ triprolidine หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่น ๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
- มีหรือเคยมีโรคไต โรคเบาหวาน โรคต่อหีน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โรคต่อมลูกหมากโต มีปัญหาในการปัสสาวะ
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลิ้มรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปยาที่ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้น การลิ้มรับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย และไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาในมือต่อไปแต่หากรับประทานตามกำหนดเวลาให้รับประทานยาทันทีที่มีก็ได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้เคียงกับมือต่อไปให้ข้ามไปรับประทานยามือต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ปากแห้ง คอแห้ง คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องผูก เบื่ออาหาร ไม่สบายท้อง ง่วงซึม

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- หัวใจเต้นผิดปกติ สับสน ประสาทหลอน มีความคิดหรือพฤติกรรมผิดปกติ เวียนศีรษะอย่างรุนแรง วิตกกังวล กระสับกระส่าย ตื่นเต้น กระวนกระวายใจ อาการของความดันโลหิตสูง เช่น ปวดศีรษะอย่างรุนแรง มองเห็นภาพไม่ชัด เจ็บหน้าอก อาการชา การชัก เลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ อ่อนเพลียผิดปกติ ใช้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยร่างกาย อาการเหมือนจะเป็นไข้ ปัสสาวะน้อยลงหรือไม่ปัสสาวะเลย

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อน เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา