



CLARITHROMYCIN

ชื่อสามัญ : CLARITHROMYCIN

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อหู ไซนัส ผิวหนัง และลำคอ
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อ เช่น โรค Lyme โรค cryptosporidiosis โรค cat scratch โรค Legionnaires และ โรคไอกรน
- ยานี้ใช้ร่วมกับยาตัวอื่น เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ที่เป็นสาเหตุให้เกิดแผลอักเสบ หรือแผลในกระเพาะอาหาร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ disseminated Mycobacterium avium complex (การติดเชื้อที่ปอดชนิดหนึ่งซึ่งส่งผลต่อผู้ที่มีไวรัสภูมิบกพร่องหรือHIV)
- ยานี้อาจใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่หัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหรือผ่าตัดทางทันตกรรม

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 7-14 วัน อาจรับประทานยานี้พร้อมมื้ออาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้ ควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกครั้งเพื่อป้องกันการลืมยา ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยาดังกล่าวจนครบระยะเวลาที่แพทย์สั่ง แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ยานี้เป็นยาของท่านคนเดียวเท่านั้นอย่าใช้ยานี้ร่วมกับคนอื่น

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- แพ้ยา clarithromycin, azithromycin, dirithromycin, erythromycin, telithromycin หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรรวมทั้งส่วนผสมอาหารและสารกันบูด
- มีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ prolong QT interval ทั้งประวัติความผิดปกติของตนเองและญาติพี่น้องในครอบครัว รวมถึงมีการใช้ยาอื่นที่มีอาจมีผลทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วย
- เป็นหรือเคยเป็นโรคตับ ตาเหลืองตัวเหลือง โรคไต มีอาการท้องเสีย หรือโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
- ตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- หากกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือทำทันตกรรมใด ๆ กรุณาแจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ให้ทราบว่าท่านกำลังใช้ยาดังกล่าวอยู่

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ท้องเสีย ปวดท้อง มีลมในท้อง คลื่นไส้ การรับรสเปลี่ยนไป ปวดศีรษะ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- อาการแพ้ ผื่นคัน บวมบริเวณใบหน้า ตา ปาก ลิ้น ที่ผิวหนังหรือภายในปากมีแผล ตุ่มพอง ลอก
- หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เจ็บหน้าอก ปัสสาวะลำบาก หรือเจ็บเวลาถ่ายปัสสาวะ ตัวเหลือง ตาเหลือง หายใจลำบาก กลืนลำบาก เสียงแหบ มีรอยฟกช้ำจ้ำเลือดตามตัว

บวมบริเวณ มือ เท้า ข้อเท้า

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ควรเป็นภาชนะที่ป้องกันแสงได้ เช่น ขวดหรือซองสีชา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียสโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น รวมถึงไม่เก็บในห้องน้ำ
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษากร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา