



DEXTROMETHORPHAN [HYDROBROMIDE]

ชื่อสามัญ : DEXTROMETHORPHAN [HYDROBROMIDE]

รูปแบบยา : ยาน้ำเชื่อม

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- รักษาอาการไอ เนื่องจากใช้หวัด หวัด

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานทุก 4-12 ชั่วโมง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีไม่ควรใช้และควรใช้อย่างระมัดระวังในเด็กอายุ 2-11 ปี
- ควรใช้ยอนี้สำหรับดวงตาโดยเฉพาะในการรับประทานยา ไม่ควรใช้ยอนี้ในกรณีของข้อต่อในกระดูกหรือข้อต่อในกระดูกอ่อน
- เมื่อได้รับยาเกินขนาด อาจแสดงอาการดังต่อไปนี้
 1. หายใจลำบาก
 2. ปากเขียว เล็บเขียว
 3. มึนศีรษะ
 4. คลื่นไส้ อาเจียน
 5. ประสาทหลอน
 6. ใจสั่น
 7. กล้ามเนื้อเกร็ง
 8. ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง โดยอาจเกิดได้ทั้งความดันสูงและความดันต่ำ
- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด แนะนำให้นำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- ข้อมูลที่จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิต
 1. อายุ น้ำหนัก และอาการของผู้ป่วย
 2. ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า และขนาดยา
 3. หากเป็นไปได้ให้นำผลิตภัณฑ์นั้นติดตัวไปด้วย
 4. เวลาที่เริ่มรับประทานยาเกินขนาด
 5. เวลาที่เริ่มเกิดอาการผิดปกติ
 6. จำนวนของยาที่ได้รับประทานเข้าไป

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา เดกโทรเมโทรเฟน หรือยาอื่น
- ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง? วิตามิน? อาหารเสริม ?และสมุนไพร
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- มีหรือเคยมีโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketouria) สูบบุหรี่

[ทำอย่างไรหากลิ้มรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลิ้มรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอื่นไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอื่นไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ เหนื่อยง่าย ระบายเคืองกระเพาะอาหาร ปวดศีรษะ เหนื่อยออกง่าย คับ คลื่นไส้

[อาการอื่นไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ ผื่นแดง

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา