



AMOXICILLIN

ชื่อสามัญ : AMOXICILLIN

รูปแบบยา : แคปซูล

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อที่หู จมูก ลำคอ ผิวหนัง ระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคหนองใน
- อาจใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหารจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร (H.pylori)

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้รับใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้เป็นยาแคปซูล โดยทั่วไปรับประทานทุก 8-12 ชม. (วันละ 2-3 ครั้ง) ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ให้เป็นเวลาเดียวกันของทุกวัน
- ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยาดังกล่าวจนครบระยะเวลาในการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการดื้อยาได้

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- การแพ้ยานี้, เพนนิซิลิน (penicillin), ยาในกลุ่มเซฟาโลสปอริน (cephalosporin) หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
- มีหรือเคยมีโรคภูมิแพ้ หอบหืด ไช้ละอองฟาง ผื่นลมพิษหรือ โรคตับ โรคไต ท้องเสียจากการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (phenylketonuria)
- การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ ไม่สบายท้อง อาเจียน ท้องเสีย

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- ผื่นคันตามผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจลำบาก ปัสสาวะมีสีเข้ม ปากแดง เป็นแผลพุพอง มีการลอกของผิวหนังในช่องปาก ผิวลอก หรือเป็นแผลพุพอง ชัก ตัวเหลืองตาเหลือง มีจ้ำเลือด มีเลือดออก ผิวหนังช้ำ อ่อนแรง เหนื่อยง่าย มีไข้ ปวดท้อง ท้องเสียรุนแรง

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น กระจกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น

- ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
-

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา