



QUETIAPINE FUMARATE

ชื่อสามัญ : QUETIAPINE FUMARATE

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- รักษาอาการทางจิตเภท
- รักษาภาวะคลุ้มคลั่งหรือซึมเศร้าที่เกิดจากโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder)
- อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานพร้อมอาหารวันละ 2-4 ครั้งหรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามหยุดใช้ยาเอง ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
- ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรกลหลังจากรับประทานยา
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้
- ยานี้อาจทำให้ร่างกายเย็นลงได้ถ้าเมื่อต้องสัมผัสกับอากาศร้อนจัด
- ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียน ขณะตื่นนอนตอนเช้า จึงควรลุกจากเตียงอย่างช้าๆ หรือนั่งพักสักครู่ก่อนลุกขึ้นยืน
- ยานี้อาจทำให้ปากแห้งได้ ดังนั้นควรดื่มน้ำมากๆหรือเคี้ยวหมากฝรั่งในระหว่างวัน
- การใช้ยานี้ในเด็กหรือผู้สูงอายุเกิน 65 ปี ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
- ยานี้ใช้รับประทานเฉพาะบุคคล ไม่ควรให้ผู้อื่นรับประทานด้วย แม้จะมีอาการใกล้เคียงกับผู้ป่วยก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
- ยานี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา quetiapine หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- มีหรือเคยมีโรคเบาหวาน ชัก ความดันโลหิตสูง ไخمันคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งเต้านม โรคตับ โรคไต โรคไทรอยด์
- หากท่านกำลังจะเข้ารับการรักษาโรค หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้

[ทำอย่างไรหากลิ้มรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลิ้มรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ เวียนศีรษะ ง่วงซึม ปวดศีรษะ ปากแห้ง ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ท้องผูก อาหารไม่ย่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักเพิ่ม

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ หนามัด เป็นลม ชัก การมองเห็นเปลี่ยน ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้น ปาก แขน ขา ศรีษะ คอ ปวดเมื่อยมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ไข้ อ่อนเพลีย มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อยึดตึง หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ ความคิดสับสน มีเลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ กลืนลำบาก หายใจลำบาก ผื่นคัน หรือลมพิษ ผื่นพุพอง อารมณ์ไม่คงที่ พยายามคิดฆ่าตัวตาย ปัสสาวะบ่อยขึ้น หิวหรือกระหายน้ำเพิ่มขึ้น

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้ร้อนกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา