



## QUETIAPINE FUMARATE

ชื่อสามัญ : QUETIAPINE FUMARATE

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้ใช้รักษาโรคจิตเภท
- ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาหรือป้องกันภาวะคลุ้มคลั่งหรือซึมเศร้า ที่เกิดจากโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder)
- อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-3 ครั้งโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับมื้ออาหาร หรือ หากทานยาแล้วรู้สึกไม่สบายท้อง ให้ทานพร้อมอาหารเล็กน้อย หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ในระยะแรก แพทย์อาจสั่งใช้ยาในขนาดต่ำ ๆ ก่อนแล้วจึงปรับขนาดยา ให้สอบถามวิธีใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อได้รับยาทุกครั้ง ยานี้ใช้เพื่อควบคุมอาการของโรค ควรรับประทานอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ห้ามหยุดยาเอง การหยุดยาทันทีอาจทำให้เกิดอาการถอนยา ซึ่งมีอาการ ดังนี้ คลื่นไส้ อาเจียน หลับยาก
- ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือการทำงานกับเครื่องจักรกล หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ยานี้อาจทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิให้เย็นลงได้ช้า เมื่ออยู่ในที่อากาศร้อน ควรใส่เสื้อผ้าบาง ๆ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักหรืออยู่กลางแจ้งแดด และดื่มน้ำมาก ๆ
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียน ขณะตื่นนอนตอนเช้า จึงควรลุกจากเตียงอย่างช้าๆ หรือนั่งพักสักครู่ก่อนลุกขึ้นยืน
- ยานี้อาจทำให้ปากแห้งได้ ดังนั้นควรดื่มน้ำมากๆหรือเคี้ยวหมากฝรั่งในระหว่างวัน
- ยานี้อาจทำให้หน้าหนักตัวเพิ่มได้ง่าย ควรควบคุมอาหารและออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์
- การใช้ยานี้ในเด็กหรือผู้สูงอายุเกิน 65 ปี ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา quetiapine หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- มีหรือเคยมีโรคเบาหวาน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ prolong QT หรือหากมีอาการท้องเสียหรืออาเจียนรุนแรง มีระดับแร่ธาตุโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดต่ำ หรือมีอาการขาดน้ำ ให้แจ้งแพทย์ทราบ
- มีหรือเคยมีประวัติ ชัก ต้อกระจก ความดันโลหิตต่ำ ความดันโลหิตสูง ไขมันคอเรสเตอรอลในเลือดสูง โรคหัวใจ อาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเมเร็งไตเนต มะเร็งสมอง หรือมีการบาดเจ็บที่ศีรษะ โรคตับ โรคไต โรคของไทรอยด์ เม็ดเลือดแดงต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ เกร็ดเลือดต่ำ
- หากจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำหัตถการใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้
- หากผู้ใช้ยาหรือคนในครอบครัว มีหรือเคยมีโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว คลุ้มคลั่ง มีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตาย ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับอาการและประวัติเดิม เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม กรุณาอ่านคำเตือนพิเศษเพิ่มเติม
- ยานี้อาจทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้ ถึงแม้ท่านไม่ได้มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน หากท่านมีอาการหิวน้ำบ่อยๆ ปัสสาวะบ่อย ทิวบ่อย มองเห็นภาพไม่ชัด อ่อนแรง ปากแห้งมาก คลื่นไส้ อาเจียน หายใจมีกลิ่นคล้ายผลไม้ กรุณาแจ้งแพทย์
- การใช้ยานี้ในเด็กและวัยรุ่น อาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น แพทย์จะมีการตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะ ในระหว่างที่ใช้ยา

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  
มีดังนี้ มีนงง ง่วงซึม ปวดตามข้อ หลัง คอหรือหู อ่อนแรง ปากแห้ง อาเจียน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก มีลมในท้อง ทิวบอย คัดจมูก ปวดศีรษะ เจ็บแปลบหรือชาที่แขนขา  
ประจำเดือนขาด เต้านมโตในเพศชาย มีน้ำนมไหล ความต้องการทางเพศลดลง

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- อาการซึมเศร้ามากขึ้น หรือแย่ลง มีความคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายทั้งนี้รวมถึงการวางแผนและการลงมือทำด้วย วิตกกังวลมากกว่าปกติ กระสับกระส่าย ตื่นตระหนกนอนหลับยาก มีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิดฉุนเฉียว ลงมือปฏิบัติโดยไม่ได้คิด กระสับกระส่าย ควบคุมตนเองไม่ได้ "กรุณาอ่านคำเตือนพิเศษเพิ่มเติม"
- หน้ามืด เป็นลม ชัก การมองเห็นเปลี่ยน ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้น ปาก แขน ขา ศรีษะ คอ ปวดเมื่อมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ไข้ อ่อนเพลีย มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อเกร็ง หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ ความคิดสับสน มีเลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะลำบาก เจ็บเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย กลืนลำบาก หายใจลำบาก ผื่นคัน หรือลมพิษ ผื่นพุพอง

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้ร้อนกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา