



## AMOXICILLIN [TRIHYDRATE]

ชื่อสามัญ : AMOXICILLIN [TRIHYDRATE]

รูปแบบยา : ยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อที่หู จมูก ลำคอ ผิวหนัง ระบบทางเดินปัสสาวะ โรคหนองในเทียมคลามัยเดีย ทราโคมาทิส (chlamydia trachomatis) (เป็นยาทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ที่แพทย์พิจารณาถึงความจำเป็นแล้วเท่านั้น)
- อาจใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหารจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร (H.pylori)

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้เป็นยารูปแบบผงแห้งชนิดผสมน้ำก่อนใช้ โดยทั่วไปรับประทานทุก 8-12 ชม. (วันละ 2-3 ครั้ง) ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ให้เป็นเวลาเดียวกันของทุกวัน
- ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยาติดต่อกันจนครบระยะเวลาในการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการดื้อยาได้
- การผสมยา ให้คว่ำขวด และเคาะกันขวดเบาๆ ให้ผงยากระจายตัวและไม่เกาะกัน เพื่อเวลาผสมน้ำผงยาจะได้ละลายได้ง่าย ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหรือน้ำสะอาด เติมน้ำในขวดยาให้ท่วมผงยา ปิดจุกให้แน่นแล้วเขย่าขวดให้ผงยาละลายเข้ากันดี เติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วอีกครั้งจนถึงขีดที่กำหนดไว้บนขวดยา แล้วเขย่าขวดยาให้ยาผสมกันดี
- ควรใช้ช้อนสำหรับตวงยาโดยเฉพาะในการรับประทานยา ไม่ควรใช้ช้อนชงกาแฟหรือช้อนโต๊ะในครัวเรือนทั่วไป

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- การแพ้ยา, เพนิซิลลิน (penicillin), ยาในกลุ่มเซฟาโลสปอริน (cephalosporin) หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
- มีหรือเคยมีโรคภูมิแพ้ หอบหืด ไช้ละอองฟาง ผื่นลมพิษหรือ โรคตับ โรคไต ท้องเสียจากการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (phenylketonuria)
- การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  
มีดังนี้ ไม่สบายท้อง อาเจียน ท้องเสีย

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- ผื่นคันตามผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจลำบาก ปัสสาวะมีสีเข้ม ปากแดง เป็นแผลพุพอง มีการลอกของผื่นในช่องปาก ผิวลอก หรือเป็นแผลพุพอง ซักตัวเหลืองตาเหลือง มีจ้ำเลือด มีเลือดออก ผิวหนังซีด อ่อนแรง เหนื่อยง่าย มีไข้ ปวดท้อง ท้องเสียรุนแรง

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
- ยาที่ผสมแล้วมีอายุยา 14 วันโดยให้เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาที่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง ทิ้งยานี้หากเก็บไว้เกิน 14 วัน

---

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก  
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา