



ACETYLCYSTEINE

ชื่อสามัญ : ACETYLCYSTEINE

รูปแบบยา : ยาเม็ดฟู

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ทำให้เสมหะที่เหนียวข้นเหลวลงและถูกขับออกได้ง่ายขึ้น บรรเทาอาการไอที่มีเสมหะ ในโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ของคอกอักเสบ หอบหืด ไซ้หวัด เป็นต้น
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ให้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-3 ครั้ง ขึ้นกับอาการและโรคที่เป็นอยู่ และปริมาณยาใน 1 เม็ด
- ละลายยาในน้ำครึ่งถึงหนึ่งแก้ว คนให้ละลายตัวดี รอนจนฟองฟูหมดค่อยรับประทาน
- หรือใช้ตามวิธีที่ระบุบนฉลากยา ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา acetylcysteine หรือยาอื่นๆ
- ยาประจำตัวอยู่ที่แพทย์สั่งจ่ายหรือยาที่ซื้อใช้เอง รวมถึงวิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
- ตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร หากตั้งครรภ์ระหว่างใช้ยานี้ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
- โรคประจำตัว อาการหรือโรคที่เคยเป็นมาในอดีต โดยเฉพาะ โรคกระเพาะ เป็นต้น

[ทำอย่างไรหากลิ้มรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลิ้มรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ ถ้าเป็นเวลาใกล้มื้อถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ ผื่นคันเล็กน้อย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดแสบยอดอก

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ หายใจลำบาก ผื่นคัน ลมพิษ

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้ร้อนกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา