



## SIMVASTATIN

ชื่อสามัญ : SIMVASTATIN

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้ใช้เพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจกำเริบและอาการแทรกซ้อนโรคหัวใจอื่นๆ
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนและควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้งหรือให้ใช้ยาตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- แพทย์อาจเริ่มใช้ยานี้ในขนาดต่ำกว่าก่อน แล้วจึงปรับขนาดของยาขึ้น เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
- ยานี้ใช้เพื่อควบคุมอาการ แต่ไม่ได้ทำให้ภาวะโรคหายขาด จึงควรใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และน้ำเกรปฟรุต (grapefruit juice) ในระหว่างที่รับประทานยานี้
- ห้ามใช้ยานี้หากกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา simvastatin หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (antibiotics) ยาฆ่าเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยาค้ำดันการแข็งตัวของเลือด (warfarin)
- มีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้ โรคตับ โรคไต เบาหวาน ชัก และโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความดันต่ำ
- ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร หากตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้อยู่ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
- หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือการทำให้ทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ ปวดศีรษะ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- ผื่นคัน แดงหน้าอก หรือหายใจไม่ออก หรือการบวมที่หน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ ตา มือ เท้า ข้อเท้า ขา หรือแผลพุพอง ลอกที่ผิวหนังและเยื่อบุปาก
- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นตะคริว
- คลื่นไส้ ร่วมกับปวดบริเวณท้องด้านขวา ตัวเหลืองตาเหลือง คัน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีน้ำตาลหรือสีเข้มผิดปกติ
- อาการอื่นๆ เสียงแหบ เหนื่อยง่าย มีไข้ หนาวสั่น แพ้แสงหรือไวต่อแสง ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะลำบาก

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

---

มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก  
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา