



SIMVASTATIN

ชื่อสามัญ : SIMVASTATIN

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก และออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และลดโอกาสที่จะต้องผ่าตัดหัวใจในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคหัวใจ
- ยานี้ใช้เพื่อลดระดับไขมันเลว LDL-cholesterol และลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ ในกระแสเลือด และทำให้ระดับไขมันดี HDL-cholesterol เพิ่มขึ้น
- ยานี้ยังอาจใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุ 10-17 ปีที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจากกรรมพันธุ์
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้งเวลาเย็น ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาเดิมทุกวัน
- แพทย์จะพิจารณาปรับขนาดการใช้ยาตามผลการควบคุมไขมันในเลือด โดยทั่วไปจะประเมินหลังใช้ยา 4 สัปดาห์
- ยานี้ต้องรับประทานต่อเนื่องเพื่อผลการควบคุมไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ไม่ควรหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- รับประทานยาตามวิธีใช้ยาที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา simvastatin หรือแพ้ยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (antibiotics) ยาฆ่าเชื้อรา ยาด้านไวรัส ยาด้านการแข็งตัวของเลือด (warfarin)
- มีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้ โรคตับ โรคไต เบาหวาน ชัก และโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความดันต่ำ
- ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร หากตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้อยู่ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
- หากท่านกำลังจะเข้ารับการรักษาหรือการผ่าตัดใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ ปวดศีรษะ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- แพ้ยา เกิดผื่น คัน ลมพิษ ตุ่มน้ำใส มีอาการบวมที่ใบหน้า ลำคอ ริมฝีปาก ลิ้น รอบดวงตา บวมที่มือ แขน ขา เท้าหรือข้อเท้า เสียงแหบ หายใจลำบาก
- อาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ เช่น ปวดเมื่อย กัดเจ็บ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

- มีปัสสาวะน้อยลง ปัสสาวะเป็นสีเข้มมาก มีไข้ หนาวสั่น ไม่มีมีแรง ปวดข้อ แพ้แสง
- อาการผิดปกติของตับ เช่น เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ปวดท้องด้านขวา มีอาการคล้ายเป็นไข้ ปัสสาวะมีสีเข้ม มีรอยช้ำจ้ำเลือดหรือเลือดออกง่ายผิดปกติ

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา