



LOPERAMIDE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ : LOPERAMIDE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการท้องเดิน

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยามีดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยานี้ 1 เม็ด เฉพาะเมื่อมีอาการ และสามารถรับประทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมงถ้ายังมีอาการท้องเสียอยู่หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่ควรรับประทานยานี้ติดต่อกันนานเกิน 1 สัปดาห์
- หากรับประทานยาแล้ว มีไข้ ปวดท้องรุนแรง หรือ อุจจาระมีเลือดปน หรือ อาการท้องเดินไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- การแพ้ยาโลเพอราไมด์ (loperamide) หรือแพ้ยาอื่นๆ
- ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่ท่านใช้อยู่
- วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
- มีไข้
- มีมูกเลือดปนในอุจจาระ
- การมีความผิดปกติของการทำงานของตับ
- การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- ใช้ยานี้เฉพาะเมื่อมีอาการท้องเดินเท่านั้น และห้ามรับประทานยาเกินขนาดที่แนะนำ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ง่วงซึม เวียนศีรษะ ปากแห้ง รู้สึกไม่สบายท้อง ท้องผูก ท้องอืด

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ อุจจาระเป็นสีดำหรืออุจจาระมีเลือดปน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หายใจหอบ หายใจลำบาก สายตาพร่า เบื่ออาหาร

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก

- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 - ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
-

มีปัญหาเรื่องยา ปรีกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา