



SENNOSIDES A & B

ชื่อสามัญ : SENNOSIDES A & B

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- บรรเทาอาการท้องผูก
- อาจใช้สำหรับเตรียมลำไส้ก่อนผ่าตัดหรือส่องกล้อง
- อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง ตอนเย็นหรือก่อนนอน เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ระบายในตอนเช้า (8-12 ชั่วโมงภายหลังรับประทานยา) หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยานี้พร้อมดื่มน้ำตาม 1 แก้ว
- ห้ามใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-12 ปีควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
- กรณีต้องใช้ยาเป็นระยะเวลานาน ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา sennosides ยาระบายมะขามแขก หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- มีหรือเคยมีโรคไตตึงอักเสบ ปวดท้อง ทางเดินอาหารอุดตัน อาเจียน

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ ท้องอืด ปัสสาวะเปลี่ยนสี ไม่สบายท้องน้อยหรือตะคริวที่ท้องน้อย

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ ท้องเสีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลดผิดปกติ

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น

- ทิ้งยานี้เมื่อหายหมดอายุ
-

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา