



PREGABALIN

ชื่อสามัญ : PREGABALIN

รูปแบบยา : แคปซูล

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทในผู้ป่วยโรคเส้นประสาทซึ่งเกิดจากเบาหวาน (diabetic neuropathy) หรือในผู้ป่วยที่มีการปวดประสาทซึ่งเกิดหลังมีเหตุมาจากงูสวัด (postherpetic neuralgia) หรือจากการบาดเจ็บเส้นประสาทไขสันหลัง หรือโรคปวดกล้ามเนื้อ (fibromyalgia)
- ช่วยควบคุมอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชัก
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา กรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง และไม่ควรหยุดใช้ยาเอง แม้ว่าจะรู้สึกอาการดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการหยุดใช้ยา การหยุดยาเองอาจทำให้เกิดอาการถอนยาได้ เช่น เช่น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดศีรษะ ชัก
- การรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือนมจะช่วยลดอาการไม่สบายท้องซึ่งเกิดจากยาได้
- ในผู้ป่วยบางรายยานี้อาจทำให้เวียนศีรษะหรือง่วงซึมได้ หากเกิดอาการดังกล่าวไม่ควรขับซิ่งหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล และเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- แพีย pregabalin หรือแพียอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรรวมทั้งส่วนผสมอาหารและสารกันบูด
- มีหรือเคยมีประวัติความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต เช่น ต้อหิน หรือมีประวัติการติดยา เลือดออกผิดปกติ มีความคิดหรือวางแผนฆ่าตัวตาย
- ตั้งครรภ์ วางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
- หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ มีนศีรษะ ปากแห้ง คลื่นไส้ ปวดศีรษะ น้ำหนักเพิ่ม

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- ผื่นคัน ผื่นลมพิษ ตุ่มพอง มีอาการบวมที่ริมฝีปาก ลิ้น เหงือก ลิ้น เป็นต้น
- ตื่นตระหนก กระสับกระส่าย หงุดหงิดฉุนเฉียว วิดกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ก้าวร้าว โกรธ มีพฤติกรรมที่รุนแรง คลุ้มคลั่ง คิดหรือวางแผนฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง มีพฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ เช่น แยกตัวออกจากเพื่อนหรือครอบครัว เป็นต้น
- มองภาพไม่ชัด เห็นภาพซ้อน มีอาการสั่น สับสน เลือดหยุดไหลยาก เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกว่ามีลำคอติด ลมง่าย หรือทรงตัวลำบาก แขน ขากระตุก
- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือกดเจ็บ โดยเฉพาะหากอาการเหล่านี้เกิดร่วมกับอาการไข้ หรือเหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ

[การเก็บรักษายา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ หรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไปและปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการทิ้งที่เหมาะสม

มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา