



## DICLOFENAC [SODIUM]

ชื่อสามัญ : DICLOFENAC [SODIUM]

รูปแบบยา : แคปซูล (ควบคุมการปลดปล่อยยา)

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- บรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะอักเสบของข้อ เช่น ข้ออักเสบกระดูกอักเสบ (osteoarthritis) ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) และ ข้ออักเสบกระดูกสันหลังอักเสบ (ankylosing spondylitis) บรรเทาอาการปวดประจำเดือน
- ยานี้อาจใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากสาเหตุอื่น เช่น อาการปวดจากโรคเกาต์ โรคกระเพาะ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดควบคุมการปลดปล่อยยา ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัดโดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ควรรับประทานยา Diclofenac หลังอาหารทันที พร้อมดื่มน้ำตามหนึ่งแก้ว เพื่อลดไม่พึงประสงค์ต่อทางเดินอาหาร เช่น ไม่สบายท้อง แสบท้อง
- ยานี้อยู่ในรูปแบบเม็ดรูปแบบควบคุมการปลดปล่อยด้วย ควรรับประทานยาโดยกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด หัก เคี้ยว เมื่อยา และไม่ควรรับประทานพร้อมกับยาลดกรด

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยาใดโคลิจิแนค (diclofenac) แอสไพริน (aspirin) หรือยาอื่น ๆ ในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ibuprofen naproxen หรือส่วนผสมประกอบอื่นๆที่อยู่ในตำรับยา
- ใช้หรือกำลังใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะ ยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น ๆ ยาด้านการแข็งตัวของเลือด ยารักษาโรคเบาหวาน ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ เป็นต้น
- มีหรือเคยมีภาวะหอบหืด โดยเฉพาะถ้ามีอาการกำเริบบ่อยๆ มีภาวะตั้งเนื้อที่โพรงจมูก (nasal polyps) และหอบหืดที่เกิดจากยาแอสไพริน (aspirin)
- มีโรคประจำตัวอื่น เช่น มีความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต ภาวะ porphyria มีภาวะแพ้ภูมิตัวเอง (systemic lupus erythematosus) เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไชมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน
- มีประวัติเป็นโรคหัวใจ มีอาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคดังกล่าว และผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดทำศัลยกรรมปลูกถ่ายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (coronary bypass graft surgery)
- มีประวัติเกิดแผลในทางเดินอาหาร เช่น ภาวะอาหาร ลำไส้
- เคยมีประวัติการบวมที่มือ แขน น่อง เท้า หรือข้อเท้า
- ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 (ช่วง 2-3 เดือนก่อนคลอด) หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- หากต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำฟัน ต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ผ่าตัดหรือทันตแพทย์ทราบก่อนว่าท่านใช้ยาดังนี้อยู่
- ประวัติของสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

[ทำอะไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ น้ำหนักขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ ไม่มีแรง เบื่ออาหาร ปวดท้อง ผิวหรือตามีสีเหลือง อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไข้ กลืนลำบาก เสียงแหบ (hoarseness) อาการบวม หรือเป็นตะคริวที่ท้อง ท้องเสีย หรือท้องผูก มีลมในท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ มีเสียงดังในหู รู้สึกไม่สบายท้อง

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- อาการแสดงความเสี่ยงการเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ควรไปพบแพทย์ทันที เช่น เจ็บแน่นหน้าอก หายใจขัดหรือหายใจลำบาก ร่างกายอ่อนแรงครึ่งซีก มีปัญหาการพูด
- อาการแสดงความเสี่ยงการเกิดความผิดปกติของทางเดินอาหาร ควรหยุดใช้ยาทันทีและแจ้งให้แพทย์ทราบ เช่น ปวดท้อง แสบร้อนกลางอก อาเจียนเป็นเลือดหรือเป็นสีกาแฟ อุจจาระมีเลือดปน มีสีดำ หรือลักษณะคล้ายน้ำมันดินมีว ซีด หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ปัสสาวะสีขุ่นหรือปนเลือด ปวดหลัง ปัสสาวะลำบาก
- อาการอื่นๆ ผลพวง (blisters) ผื่น ผื่นลมพิษ อาการคัน อาการบวมที่บริเวณตา ใบหน้า ลิ้น ริมฝีปาก คอ มือ แขน เท้า ข้อเท้า หรือน่อง

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก  
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา