



## DOMPERIDONE

ชื่อสามัญ : DOMPERIDONE [MALEATE]

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการอาหารไม่ย่อย, แสบยอดอก ท้องอืด ปวดท้องหรือมีลมในกระเพาะมากเกินไป

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้รับใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยรับประทานยานี้ตามแพทย์สั่งหรือ ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยา ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- การแพ้ยาโดมเพอริโดน (Domperidone) หรือยาอื่นๆ
- ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพรที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
- มีหรือเคยมีโรคลำไส้อุดตัน ลำไส้รั่ว หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
- มีหรือเคยมีโรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมพิทูอิทารี
- การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  
มีดังนี้ -

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ กล้ามเนื้อที่หน้าหรือตัว สั่นหรือกระตุก ผื่นผิวหนัง เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีน้ำนมไหลออกมา สมรรถภาพทางเพศลดลง

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหारे่องยา ปรีกษาเภสัชร ด้วยความปรารถนาดีจาก  
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา