



SERTRALINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ : SERTRALINE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- รักษาโรคซึมเศร้า และความผิดปกติทางจิตอื่นๆ เช่น ภาวะย้ำคิดย้ำทำ (obsessive compulsive disorder) ภาวะตื่นตกใจมาก (panic disorder) และช่วยลดความเครียดของผู้ป่วยหลังได้รับผ่าตัด (posttraumatic stress disorder) หรือความวิตกกังวลอื่นๆ
- รักษาอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน (premenstrual dysphoric disorder) เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด นอนห้อง คัดตึงเต้านม รักษาอาการปวดศีรษะ และอาการหลังเร็วในผู้ชาย
- อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้น หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง ในเวลาเช้า หรือเวลาเย็น สำหรับการรักษารักษาอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน อาจรับประทานตามวันที่กำหนดของเดือน โดยรับประทานยาในเวลาเดิมทุกวัน หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- แพทย์อาจเริ่มให้ใช้ยาขนาดต่ำ ๆ แล้วปรับขนาดยา โดยทั่วไปจะปรับสัปดาห์ละครั้ง รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยาได้ เช่น อาการคลื่นไส้ เหงื่อออก อารมณ์เปลี่ยนแปลง ซึมเศร้า เป็นต้น
- ในผู้ป่วยบางรายยานี้อาจทำให้เวียนศีรษะหรือง่วงซึมได้ หากเกิดอาการดังกล่าวไม่ควรขับรถหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา sertraline หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังใช้ยา monoamine oxidase (MAO) inhibitors เช่น isocarboxazid phenelzine selegiline tranylcypromine หรือท่านหยุดใช้ยาในกลุ่ม MAO inhibitor ภายใน 14 วันก่อนมาพบแพทย์ หรือสมุนไพร St. John's wort
- ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง รวมทั้ง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
- มีหรือเคยมีอาการโรคหัวใจขาดเลือด หัวใจวายเฉียบพลัน ลมชัก โรคตับ โรคเบาหวาน เคยได้รับการรักษาจิตเวชด้วยไฟฟ้า
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- หากผู้ใช้ยานี้หรือคนในครอบครัว มีหรือเคยมีโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว คลุ้มคลั่ง มีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตาย ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับอาการและประวัติเดิม เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม
- หากจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำหัตถการใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยาให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไปให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ มีเหงื่อเย็น ท้องเสีย หรือท้องผูก นอนไม่หลับ ง่วงซึม ปากแห้ง ตัวแดง ร้อนวูบวาบปวดศีรษะ อาหารไม่ย่อย รู้สึกคลื่นไส้ มีลมในกระเพาะอาหารความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีเหงื่อออกมาก มีอาการสั่น สมรรถภาพทางเพศลดลงปวดหรือรู้สึกมีเข็มที่ปลายแขนปลายขา

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- เกิดอาการซึมเศร้าหรืออาการซึมเศร้าแย่งลง มีความคิดทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย วิตกกังวลมากกว่าปกติ กระสับกระส่าย ตื่นตระหนก นอนหลับยาก มีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิดฉุนเฉียว ทำอะไรขาดความยั้งคิด กระสับกระส่าย ควบคุมตนเองไม่ได้
- ผื่นคัน ผื่นลมพิษ ใบหน้าหรือริมฝีปากบวม แขนงหน้าอก หายใจลำบาก
- เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ อาเจียน กระวนกระวาย หงุดหงิดง่าย รู้สึกตื่นตกใจง่าย โกรธมาก ก้าวร้าว กระสับกระส่าย อยู่นิ่งไม่ได้ พุดเร็ว ควบคุมการกระทำของตนเองไม่ได้ รู้สึกอยากทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย หรือรู้สึกมีความสุขมากสลับกับรู้สึกซึมเศร้า ประสาทหลอน หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น ลมชัก ถ่ายอุจจาระมีสีดำ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ปัสสาวะหรืออาเจียนเป็นเลือดเลือดออกหรือมีรอยฟกช้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ มีไข้ มองภาพไม่ชัด วูบหมดสติ

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา รักษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา