



COLCHICINE

ชื่อสามัญ : COLCHICINE

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- รักษาอาการปวดเกาต์ระยะเฉียบพลัน ป้องกันอาการของโรคเกาต์และอาการกำเริบของโรค (gouty attack)
- รักษาโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน Familial Mediterranean fever (FMF)

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- โดยทั่วไปรับประทานวันละ 12 ครั้ง หากใช้ป้องกันโรคเกาต์กำเริบหรือรักษาโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน ควรใช้ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง ไม่ควรหยุดยาเองแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้น โดยไม่ปรึกษาแพทย์
- โดยทั่วไปหากใช้รักษาอาการปวดเกาต์ระยะเฉียบพลัน รับประทานครั้งที่สองห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- ไม่ควรรับประทานยานี้กับน้ำเกรปฟรุต (grapefruit) อาจจะทำให้ระดับยา colchicine ในเลือดสูงจนเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- แพทย์โคลชิซิน (colchicine) หรือแพทย์อื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง รวมทั้งวิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
- มีหรือเคยมีประวัติความผิดปกติของตับ ไต การทำงานของกระเพาะหรือลำไส้ผิดปกติ หรือโรคหัวใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความผิดปกติของระบบเลือด
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดเกร็งช่องท้อง

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ ตาบวม หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาเจียน ชาบริเวณมือ หรือเท้า มีเลือดออก หรือมีรอยขีดผื่นที่ ปาก ลิ้น หรือฝ่ามือซี้ด

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา