



CEF DINIR

ชื่อสามัญ : CEF DINIR

รูปแบบยา : ยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ติดเชื้อในหู โขนอักเสบ คอหอยอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ และโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาอาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้ เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบผงละลายน้ำก่อนใช้ ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละหนึ่งถึงสองครั้ง หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- เขย่าขวดให้ตัวยาสม่ำเสมอทุกครั้งที่ก่อนรินยา ใช้ช้อนตวงหรือหลอดยาที่ได้รับมาพร้อมกับยาในการตวงยาทุกครั้ง
- ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องจนครบระยะเวลาในการรักษาถึงแม้อาการจะดีขึ้นแล้ว ไม่ควรหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยาเซฟติเนีย (Cefdinir), เพนนิซิลิน (penicillin), ยาในกลุ่มเซฟฟาโลสปอริน (cephalosporin) หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
- ยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมหรือแมกนีเซียมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ อาจมีผลลดประสิทธิภาพของยา cefdinir ควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- มีหรือเคยมีประวัติ โรคไตอักเสบ โรคเบาหวาน โรคไต
- การตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยทันทีโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ปวดท้อง อาเจียน ความอยากอาหารลดลง มีนงง ปวดศีรษะ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- ผื่นคัน ลมพิษ บวมบริเวณใบหน้า ตา ริมฝีปาก ลิ้น แขน ตามข้อหรือขา หายใจหรือกลืนลำบาก
- ติดเชื้อบริเวณช่องคลอด มีไข้หรือสั่น เนื้อเยื่อในช่องปากลอก เป็นตุ่มน้ำ แดง อาซึก ท้องเสียถ่ายเหลวเป็นน้ำ เจ็บคอ ปัสสาวะลำบาก เลือดออกผิดปกติหรือมีจ้ำเลือด เหนื่อยง่ายหรืออ่อนเพลียผิดปกติ

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
- หลังจากเปิดใช้ควรเก็บไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง และทิ้งยานี้หากใช้ไม่หมดภายใน 10 วัน

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษากร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา