



## OSELTAMIVIR PHOSPHATE

ชื่อสามัญ : OSELTAMIVIR PHOSPHATE

รูปแบบยา : ยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่และเด็ก หรือทารกอายุไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ เมื่อเริ่มมีอาการของการติดเชื้อไม่เกิน 2 วัน
- ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 1 ปี ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
- อาจใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดนก หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1)
- อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้ เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้ โดยทั่วไปให้รับประทานวันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร เข้าและเย็น ติดต่อกัน 5 วัน (การใช้ยาตอนท้องว่างอาจทำให้รู้สึกไม่สบายท้อง) การใช้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ รับประทานวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร ติดต่อกันอย่างน้อย 10 วัน หรือ 6 สัปดาห์ ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด หรือใช้ยาตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยา โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยานี้จนครบระยะเวลาการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- เขย่าขวดก่อนรินยา ควรใช้ช้อนหรือถ้วยสำหรับตวงยาโดยเฉพาะ ไม่ควรใช้ช้อนอาหารทั่วไป ไม่ควรผสมยากับเครื่องดื่มหรือนม
- การใช้ยาในเด็กเล็ก ควรใช้หลอดตวงยาและวัดขนาดยาให้ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- แพ้ยา oseltamivir หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
- เคยใช้ยานี้เพื่อรักษาหรือป้องกันโรคไข้หวัดมาก่อนหน้านี้
- ติดเชื้อ HIV หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม (AIDS) โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคปอด ผู้ที่ไม่สามารถรับน้ำตาลฟรุกโตสได้
- ตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
- หากท่านเคยใช้ยานี้ แล้วมีอาการข้างเคียงใดๆ กรุณาแจ้งแพทย์
- เพิ่งฉีดวัคซีนหรือมีแผนที่จะรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้วัคซีนชนิดพ่นจมูก ห้ามให้น้ำนี้ 48 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน และ ภายใน 2 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป (น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า หากลืมรับประทานยาหลายครั้งติดต่อกันควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- อาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ ตาบวม หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม
- ประสาทหลอน วิดกักังกล สับสน ชัก หายใจหรือกลืนลำบาก ตุ่มน้ำหรือแผลที่ผิวหนังหรือในปาก เสียงแหบ พูดลำบาก ล้น

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายตามท้องตลาดสามารถเก็บที่อุณหภูมิได้ 10 วัน หากเก็บในตู้เย็น ที่ 2-8 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ 17 วัน ห้ามแช่แข็ง
- หากเป็นยาที่เภสัชกรเตรียมขึ้นเฉพาะราย สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 5 วัน หากเก็บในตู้เย็น ที่ 2-8 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ 35 วัน
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

---

มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา