



HYDROXYZINE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ : HYDROXYZINE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- รักษาอาการจากการแพ้ เช่น คัน
- ช่วยควบคุมอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเคลื่อนไหว
- อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3 หรือ 4 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะและควบคุมเครื่องจักร
- หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้
- ยานี้อาจทำให้ตาแห้งและการมองเห็นไม่ชัดเจนได้ หากท่านใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกไม่สบายตา ให้ปรึกษาจักษุแพทย์
- แจ้งแพทย์ว่าท่านกำลังรับประทานยานี้อยู่ หากท่านเข้ารับการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา hydroxyzine หรือยาในกลุ่ม antihistamines อื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- ประวัติการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ
- มีหรือเคยมีอาการถ่ายปัสสาวะลำบาก (เนื่องจากต่อมลูกหมากขยายขนาดขึ้น) โรคต่อหิน โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด โรคความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ อาการชัก
- หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำการทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ ไม่สบายท้อง ง่วงซึม ปวดศีรษะ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ ถ่ายปัสสาวะลำบาก ชัก ความคิดสับสน สั่น อาการพูดคำละละเลื้อย (slurred speech)

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา