



MONTELUKAST [SODIUM]

ชื่อสามัญ : MONTELUKAST [SODIUM]

รูปแบบยา : ยาเม็ดชนิดเคี้ยว

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการหายใจลำบาก แน่นหน้าอก หายใจหืดเนื่องจากหายใจขัด (wheezing) และอาการไอ ที่มีสาเหตุจากโรคหืด และใช้เพื่อป้องกันอาการหลอดลมตีบในระหว่างการออกกำลังกาย
- นอกจากนี้อาจใช้ยานี้ในการรักษาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้ตามฤดูกาล (seasonal) หรือแพ้ตลอดปี (perennial) โดยมักมีอาการจามและคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือคันจมูก

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับเคี้ยวก่อนรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยานี้วันละครั้ง โดยต้องเคี้ยวยาให้ละเอียดแล้วจึงกลืนยาพร้อมกับการรับประทานน้ำ 1 แก้ว หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- เมื่อใช้ในโรคหืด ให้รับประทานยานี้ตอนเย็น
- เมื่อใช้ป้องกันหลอดลมตีบเกร็งระหว่างออกกำลังกายให้รับประทานยาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการออกกำลังกาย แต่ถ้าปกติรับประทานยานี้เป็นประจำวันละครั้งทุกวันอยู่แล้ว ก็ไม่ควรรับประทานยานี้เพิ่มก่อนการออกกำลังกายในแต่ละครั้งอีก
- เมื่อใช้เพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้ อาจรับประทานในเวลาช่วงใดของวันก็ได้ แต่ควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน
- ห้ามใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการหืดแบบเฉียบพลัน (acute asthma attack) แต่ต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำแม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อควบคุมอาการหืดและอาการเยื่อจมูกอักเสบเนื่องจากการแพ้ ห้ามหยุดใช้ยานี้เองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา montelukast หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
- มีหรือเคยมีโรคตับ
- อาการหืดแบบเฉียบพลัน การใช้ยาสเตียรอยด์ เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์และยาสูดพ่นอื่นๆ เป็นต้น
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับการรับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า แต่ไม่ควรรับประทานยา montelukast มากกว่า 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มีอาการแสบร้อนบริเวณทรวงอก ปวดท้อง ไอ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ มีอารมณ์แปรปรวน หดหู่ ซึมเศร้า จนอาจมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย มีไข้หรือมีการติดเชื้อ มือและเท้ามีอาการปวด ชา หรือรู้สึกเจ็บแปลบเหมือนกับมีเข็มเล็กๆ ทิ่ม อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (flu-like symptoms) บวมและเจ็บบริเวณไซนัส อาการแสดงของการแพ้ยา เช่น แน่นหน้าอก หายใจหรือกลืนลำบาก บวมบริเวณลิ้น ริมฝีปาก เปลือกตา หรือหน้า ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หรืออาการหายใจหืดเนื่องจากหายใจขัด (wheezing) คัน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ เสียงแหบ ปัสสาวะมีสีน้ำตาลหรือสีเข้ม ตัวเหลือง ตาเหลือง เกิดอาการช้ำหรือเลือดออกโดยง่าย

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษากร ด้วยความปรารถนาดีจาก

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา