



BENZHEXOL HYDROCHLORIDE

ชื่อสามัญ : BENZHEXOL HYDROCHLORIDE

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- รักษาโรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) รักษาอาการสั่นที่มีสาเหตุมาจากการรับประทานยาบางชนิด

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง (รับประทานตามมื้ออาหารและก่อนนอน) หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
- ควรรับประทานพร้อมอาหารหรือนม ในการรักษาโรคพาร์กินสันจะต้องรับประทานยานี้อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการ เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ตื้อขึ้นหลังจากการรับประทานยา ไม่ควรเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมที่มากเกินไปโดยเฉพาอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ
- ในผู้ป่วยบางราย การรับประทานยานี้จะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้ หากมีอาการดังกล่าวไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติแพ้ยา เบนซ์เฮกซอลหรือยาอื่น ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- มีหรือเคยมี โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ ต้อหิน ความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis) ท้องผูก โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ ช่องท้อง ต่อมลูกหมาก
- หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า หรือถ้ารับประทานก่อนนอน แต่นึกได้ตอนเช้าให้ข้ามมื้อนั้นไปแล้วรับประทานครั้งต่อไปในเวลาเดิม

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ง่วงซึม คลื่นไส้

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- การมองเห็นเปลี่ยน ไข้ เจ็บตา ชีมน้ำตา บวมบริเวณหน้า ริมฝีปาก ลิ้น ปะสาทหลอน ผื่นแดง คัน ผื่นลมพิษ สับสน หัวใจเต้นเร็ว ไม่เป็นจังหวะ อาเจียน

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา