



ETHAMBUTOL [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ : ETHAMBUTOL [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ ได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาวัณโรค และเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่น
- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ ได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบเม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง ตอนเช้า ใช้ยาตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- การใช้เพื่อรักษาวัณโรค ต้องใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายเดือน ต้องรับประทานยาติดต่อกันจนครบระยะเวลาในการรักษา แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากใช้ยาไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้เชื้อวัณโรคดื้อต่อยาหรือทำให้อาการของโรคแย่ลงได้
- หากรับประทานยานี้แล้วรู้สึกไม่สบายท้อง ให้รับประทานยาพร้อมกับมื้ออาหาร
- การใช้ร่วมกับยาลดกรด อาจทำให้การดูดซึมของ ethambutol ลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อลดลงด้วย ควรเว้นระยะห่างในการรับประทานยาโดยรับประทานยานี้ก่อนยาลดกรด 1 ชั่วโมง หรือหลังยาลดกรด 2 ชั่วโมง

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- แพีย ethambutol หรือยาอื่นๆ
- ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพร
- มีหรือเคยมีโรคไต โรคเก๊าท์ หรือโรคเกี่ยวกับดวงตา เช่น โรคต้อกระจก
- การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ เบื่ออาหาร ไม่สบายท้อง อาเจียน รู้สึกชาหรือเหมือนมีเข็มทิ่มตามมือหรือเท้า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้

- อาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ ตาบวม หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจลำบาก
- การมองเห็นเปลี่ยนไป หรือแยกสีแดงหรือสีเขียวไม่ได้ สับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ ประสาทหลอน มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ เจ็บหรือปวดตามข้อ ข้อบวม ขาตามแขน ขา ปัสสาวะลำบากหรือน้อยลง อ่อนเพลีย

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยาเมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา