



OMEPRAZOLE

ชื่อสามัญ : OMEPRAZOLE

รูปแบบยา : แคปซูล

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อช่วยรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก และผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน
- ยานี้ใช้เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน หรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก
- ยานี้ใช้เพื่อลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะ การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า อย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง หรือตามแพทย์สั่ง
- ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยา ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้ยามากกว่า 2 สัปดาห์หรือเป็นเดือน ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา แม้ว่าอาการของโรคจะหายไป
- ไม่ควรแบ่ง หรือเคี้ยวเม็ดแคปซูลเพื่อรับประทาน แต่ถ้าไม่สามารถกลืนเม็ดแคปซูลให้แกะเม็ดแคปซูลแล้วผสมผงยาทั้งหมดลงในน้ำดื่มปริมาณเล็กน้อยแล้วดื่มได้
- รับประทานยาพร้อมน้ำดื่มสะอาด(น้ำเปล่า) เท่านั้น ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับน้ำชนิดอื่น

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- การแพ้ยาโอเมป्राโซล (omeprazole) หรือแพ้ยาอื่นๆ
- ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง เนื่องจากประสิทธิภาพของยาที่ใช้อยู่อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ยานี้
- มีโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้ อูจาระมีสีดำน้ำหรือมีเลือดปน เจ็บหน้าอก มีอาการกลืนลำบาก มีอาการแสบร้อนกลางอกเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน
- อาการส่ายคอกร่วมกับอาการมึนงง ปวดศีรษะเล็กน้อยหรือเหงื่อออก
- มีโรคตับ ปวดท้อง น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ อาเจียนมีเลือดปน หายใจหอบ
- การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
- การมีความผิดปกติของการทำงานของตับ
- กรณีใช้ยา 14 วันอย่างต่อเนื่อง (2 สัปดาห์) แล้วอาการของโรคไม่ดีขึ้น ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปหากลืมรับประทานยาก่อนอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ ปวดศีรษะ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ ผื่นลมพิษ ผื่นคัน มีอาการบวมที่หน้า ลำคอ ลิ้น เปลือกตา ตา มือ เท้า ข้อเท้าและขาส่วนล่าง มีอาการกรกลืนลำบากหรือหายใจลำบาก เสียงแหบ ชัก มีการเกร็งของกล้ามเนื้อ เจ็บกล้ามเนื้อ หรือเป็นตะคริว ปัสสาวะลำบาก มีเลือดออกผิดปกติหรือมีจ้ำเลือด มีเลือดปนในปัสสาวะ ตาเหลือง ตัวเหลือง

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ

มีปัญหาเรื่องยา กรุณาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา