



EPERISONE [HYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ : EPERISONE [HYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา : ยาเม็ด

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลายบริเวณขา หลัง รักษาอาการปวดศีรษะ รักษาอาการเจ็บบริเวณต้นคอ ใช้รักษาอาการอัมพาตหดเกร็ง (spastic paralysis) เนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาท สมองและไขสันหลัง

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับความปลอดภัยในเด็ก
- ผู้ป่วยที่รับประทานยานี้ ควรระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือการควบคุมเครื่องจักร เนื่องจากยานี้ อาจทำให้อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ง่วงซึมได้

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- ประวัติการแพ้ยา eperisone หรือยาอื่นๆ และอาหาร
- ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม สมุนไพร
- กำลังใช้ยา tolperisone hydrochloride หรือ methocarbamol
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- โรคไต โรคตับ ความผิดปกติเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ผื่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ง่วงซึม มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ไม่สบายท้อง ถ่ายเหลว อ่อนล้า ชาตามเนื้อตัว

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ มีไข้ ผื่นตามร่างกาย ตาอักเสบ ตาแดง การมองเห็นเปลี่ยนไป เกิดแผลพุพองในปากและเยื่อเมือกต่างๆ เช่น ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ อวัยวะเพศ เป็นต้น (อาการของ Stevens-Johnson & Lyells syndromes) จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง ตัวแข็ง (stiffness) หมดความรู้สึก ใจสั่นอย่างรุนแรง

[การเก็บรักษา]

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก

- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้อง โดยเก็บในที่แห้ง พ้นจากแสงและความร้อน
 - ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
-

มีปัญหาเรื่องยา ปรีกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา