



AZITHROMYCIN

ชื่อสามัญ : AZITHROMYCIN

รูปแบบยา : ยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้

[ยานี้ใช้สำหรับ]

- ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อที่หู ปอด ผิวหนัง ลำคอ และ โรค Lyme
- ยานี้ใช้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่หัวใจหรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
- รักษาโรคกระเพาะอาหารซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ H. pylori

[วิธีการใช้ยา]

วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

- ยานี้เป็นยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานยา ก่อนหรือพร้อมอาหาร วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันนาน 1-5 วัน
- ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- รับประทานยานี้จนจบช่วงการรักษา แม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม
- ไม่ควรรับประทานพร้อมแอลกอฮอล์
- ควรรับประทานยาให้ตรงตามเวลาเดียวกันทุกวัน
- เขย่าขวดให้ตัวยาคือเข้ากันดีก่อนใช้ยา
- ควรใช้ช้อนสำหรับตวงยาโดยเฉพาะในการรับประทานยา ไม่ควรใช้ช้อนชงกาแฟหรือช้อนโต๊ะในครัวเรือนทั่วไป

[สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ]

- การแพ้ยา azithromycin, ยาในกลุ่ม macrolide หรือยาอื่นๆ เช่น Erythromycin, Roxithromycin, Clarithromycin เป็นต้น
- ยาอื่นๆทั้งที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
- การเป็นหรือเคยเป็นโรค cystic fibrosis, ติดเชื้อ HIV , ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ, โรคตับ, โรคไต
- การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร

[ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา]

- โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

[อาการอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป]

อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
มีดังนี้ ไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง ผื่นคัน ผื่นลมพิษ ตัวเหลือง ตาเหลือง หัวใจเต้นผิดปกติ

[อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที]

มีดังนี้ หายใจหรือกลืนลำบาก เกิดอาการบวมบริเวณหน้า ลำคอ ริมฝีปาก ตา มือ ขา ข้อเท้า

[การเก็บรักษา]

- รับประทานในขณะบรรจุก่อนที่บรรจุมาร ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
- รับประทานที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
- ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
- เก็บยาที่ผสมแล้วในตู้เย็นช่องธรรมดา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
- ยาหลังผสมแล้วเก็บได้ 7 วัน ในตู้เย็นช่องธรรมดา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง หากเหลือหรือยังไม่ได้ใช้ให้ทิ้งทันที
- ยาที่ผสมแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 14 วัน หากเหลือหรือยังไม่ได้ใช้ให้ทิ้งทันที

มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา